

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.

DOLARJİN

Enjeksiyonluk Çözelti

Non-steroid Antienflamatuvar

BİLEŞİMİ:

Dolarjın Enjeksiyonluk Çözelti berrak, renksiz - hafif sarımtırak bir çözelti olup, 1 ml içinde 500 mg Metamizol sodyum monohidrat mevcuttur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:

Metamizol antiflojistik, analjezik, antipiretik ve spazmolitik etkili bir pirazon bileşimidir. Metamizol yangı mediatörlerinin (prostaglandin E2, prostanoidler) sentezini inhibe etmekle ve merkezi sinir sistemindeki yüksek otonom merkezler üzerine direkt veya endirekt etkilerle, yangısal ve romatizmal reaksiyonların hafifletilmesini, ağrı eşliğinin yükselmesini, düz kas spazmlarının çözülmesini, bozulan peristaltığın yeniden düzene sokulmasını, perifer damarları genişleterek çizgili kaslarda ve dokularda kan dolaşımının artırılmasını, kasların gevşemesini ve ateşin düşürülmesini sağlamak suretiyle pek çok hastalığın tedavisine yardımcı olur.

Biyoyararlılığı yüksektir. Enjeksiyon yerinden çabuk ve tam olarak emilir. Dokularda hızla aktif metabolite dönüşerek yarım saat içinde maksimal plazma ve doku konsantrasyonlarına erişir. Etkisi erken başlar ve birkaç saat (normalde 4 - 8 saate kadar) devam eder. Dağılımı yüksektir. Vücut sıvılarına, dokulara ve merkezi sinir sistemine iyi nüfuz eder. Vücutta birikim yapmaz. İdrar yolu ile hızla atılır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

Dolarjın at, sığır ve köpeklerde antienflamatuvar, analjezik, spazmolitik ve antipiretik olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Dolarjın yavaş damar içi ve kas içi yollarla uygulanır. Doku reaksiyonları meydana getirebileceği için deri altı uygulama tavsiye edilmez. Farmakolojik dozu atlarda 20 - 60 mg / kg c.a., sığırlarda 20 - 40 mg / kg c.a. ve köpeklerde 50 - 100 mg / kg c.a.'dır. Şiddetli sancılarda, diğer çok ağrılı hallerde veteriner hekimin takdirine bağlı olarak, dozun 6 - 8 ml / 100 kg c.a.'ya çıkarılması mümkündür. Uygulama ihtiyacı durumuna göre günde 8 saat araya 1 - 2 defa tekrarlanabilir.

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, muhtelif hayvan türlerindeki pratik dozları aşağıdaki gibidir:

At (her 500 kg için)	: 20 - 60 ml
Sığır (her 500 kg için)	: 20 - 40 ml
Köpek (her 10 kg için)	: 1 - 2 ml

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Yarış atlarında yarıştan önceki ve sonraki 5 gün içinde kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanım: Plasentadan geçerek fetusta solunum depresyonuna sebep olabilir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ:

Uzun süre metamizol kullanımlarında agranulositozis ve lökopeni şekillenebilir. Bu sebeple tedavi sırasında periyodik kan sayımı yapılmalıdır. Kemik iliği ve kan yapımı sağlıklı olmayan hayvanlarda kullanılmamalıdır. MSS ve kardiyovasküler sistem üzerine etkileri olduğundan kalp - damar rahatsızlığı bulunan yaşlı hayvanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Sürgün, uyusukluk, öfori, sinirlilik, kan işeme, yürüyüş bozukluğu ve serum hastalığı tipinde aşırı duyarlılık, ülserli ağız yangısı karaciğer ve böbrek yangısına yol açabilir. Etçillerde bulantı ve kusmaya yol açabilir. Metamizolün protrombin formasyonunu baskı altına alması nedeniyle kanama eğilimi artabilir. Enjeksiyon bölgesinde geçici lokal yangı ve şişkinlik oluşabilir. Şişkinlik oluşursa sıcak pansuman uygulanabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Fenilbutazon ve barbitüratlarla beraber kullanılmamalıdır. Klorpromazinle eş zamanlı kullanıldığında hipotermiye neden olacağından beraber kullanılmamalıdır. Salisilik asitle beraber kullanılmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR:

Hematopoetik sistem hastalıkları, kronik mide - bağırsak ülserleri, bronşiyal spazm ve böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ÖNLEMLER:

Toksik dozlarda kan basıncında aşırı düşme, koma, şok, konvülsiyonlar, solunum durması, hemoraji, böbrek ve karaciğer hasarı şekillenebilir. Semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Kedilerde eksitasyon ve salivasyona neden olabileceğinden kullanımı önerilmez.

GİDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için beslenen sığırlar 12 gün süreyle kesime sevk edilemez.

İnsan tüketimi için süt elde edilen ineklere uygulanamaz.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞEKLİ VE RAF ÖMRÜ:

25°C'nin altında saklanmalıdır. Buzdolabına konulmamalı ve dondurulmamalıdır. Işıktan koruyarak kutusu içinde muhafaza ediniz.

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR:

Metamizol aşırı duyarlı olduğu bilinen insanların ürüne temasında dikkatli olunmalı ve deriye teması halinde bol su ile yıkanmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

Karton kutu içerisinde; 50 ve 100 ml'lik çözelti içeren bal rengi cam şişelerde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 03.12.2004**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİNİ TARİHİ VE NO: 11.01.2001 – 10 / 920****PAZARLAMA İZİNİ SAHİBİ:**

TOPKİM - Topkapı İlaç Premiks San. ve Tic. A.Ş.
Çavuşođlu Mah. Başkumandan Cad. No:28 Kartal / İstanbul

ÜRETİM YERİ:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Çekirdeksiz Org. San. Böl. 210. Cad. No: 7 Polatlı / Ankara

İç Ambalaj Etiketi

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.

DOLARJİN

Enjeksiyonluk Çözelti
Non-steroid Antienflamatuvar

BİLEŞİMİ:

Dolarjin Enjeksiyonluk Çözelti berrak, renksiz - hafif sarımtırak bir çözelti olup, 1 ml içinde 500 mg Metamizol sodyum monohidrat mevcuttur.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

Dolarjin at, sığır ve köpeklerde antienflamatuvar, analjezik, spazmolitik ve antipiretik olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Lütfen prospektüsü okuyunuz.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Sığır eti için 12 gündür. İnsan tüketimi için süt elde edilen ineklere uygulanamaz.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞEKLİ VE RAF ÖMRÜ:

25°C'nin altında saklanmalıdır. Buzdolabına konulmamalı ve dondurulmamalıdır. Işıktan koruyarak kutusu içinde muhafaza ediniz. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

Karton kutu içerisinde; 50 ve 100 ml'lik çözelti içeren bal rengi cam şişelerde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİNİ TARİHİ VE NO: 11.01.2001 – 10 / 920

PAZARLAMA İZİNİ SAHİBİ:

TOPKİM - Topkapı İlaç Premiks San. ve Tic. A.Ş.
Çavuşoğlu Mah. Başkumandan Cad. No:28 Kartal / İstanbul

ÜRETİM YERİ:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Çekirdeksiz Org. San. Böl. 210. Cad. No: 7 Polatlı / Ankara

Seri No.

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi:

Dış Ambalaj Etiketi

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.

DOLARJİN
Enjeksiyonluk Çözelti
Non-steroid Antienflamatuvar

BİLEŞİMİ:

Dolarjin Enjeksiyonluk Çözelti berrak, renksiz - hafif sarımtırak bir çözelti olup, 1 ml içinde 500 mg Metamizol sodyum monohidrat mevcuttur.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

Dolarjin at, sığır ve köpeklerde antienflamatuvar, analjezik, spazmolitik ve antipiretik olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Dolarjin yavaş damar içi ve kas içi yollarla uygulanır. Farmakolojik dozu atlarda 20 - 60 mg / kg c.a., sığırlarda 20 - 40 mg / kg c.a. ve köpeklerde 50 - 100 mg / kg c.a.'dır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, muhtelif hayvan türlerindeki pratik dozları aşağıdaki gibidir:

At (her 500 kg için)	: 20 - 60 ml
Sığır (her 500 kg için)	: 20 - 40 ml
Köpek (her 10 kg için)	: 1 - 2 ml

GİDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için beslenen sığırlar 12 gün süreyle kesime sevk edilemez.

İnsan tüketimi için süt elde edilen ineklere uygulanamaz.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Kullanmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞEKLİ VE RAF ÖMRÜ:

25°C'nin altında saklanmalıdır. Buzdolabına konulmamalı ve dondurulmamalıdır. Işıktan koruyarak kutusu içinde muhafaza ediniz. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

Karton kutu içerisinde; 50 ve 100 ml'lik çözelti içeren bal rengi cam şişelerde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİNİ TARİHİ VE NO: 11.01.2001 – 10 / 920

PAZARLAMA İZİNİ SAHİBİ:

TOPKİM - Topkapı İlaç Premiks San. ve Tic. A.Ş.
Çavuşoğlu Mah. Başkumandan Cad. No:28 Kartal / İstanbul

ÜRETİM YERİ:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Çekirdeksiz Org. San. Böl. 210. Cad. No: 7 Polatlı / Ankara

Seri No. Üretim Tarihi : Son Kullanma Tarihi: Fiyatı: